AVERTISSEMENTS A G R I C O L E S DLP -7-9-66 533033

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

25 Francs

(AUDE, AVEYRON, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER. C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

10 72 - Septembre 1966 /41

ler supplément

CULTURES MARAICHERES DE PLEIN CHAMP

AVERTISSEMENTS

TOMATES DE CONSERVE

Mildiou et Alternaria

Les précipitations orageuses de la fin du mois d'Août ont de le mais d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais de la fin du mois d'Août ont de le mais d'Août ont de le mais de l cation au mildiou dans les secteurs du Sud et du Sud-Est au Card, les ler et 5 Septembre.

Si pour le moment aucun foyer de mildiou n'a encore été signalé la maladie peut faire son apparition dans les secteurs ci-dessus mentionnés.

Nous recommandons donc d'exécuter, dès réception du présent bulletin, et d'autant plus que de nouvelles précipitations sont prévues dans les jours à venir, un traitement fongicide généralisé dirigé contre le Mildiou.

Dans les autres secteurs où la situation est moins critique - les précipitations ayant été jusqu' ici d'une hauteur d'eau insuffisante à l'évolution d'un 3 ème cycle de mildiou - les traitements alternaria doivent être poursuivis, les orages de la fin du mois d'Août ayant été favorables à l'extension de la maladie (alternaria).

Nous rappelons la note nº 68 de Mai 1966 signalant les fongicides les plus efficaces contre ces deux maladies de la tomate.

Le Contrôleur de la Protection des Végétaux

P. CHRESTIAN

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

INFORMATIONS

Anthonome du poirier

Les vols d'anthonome du poirier vont avoir lieu.12 à 15 jours après leur apparition les adultes pondent et les jeunes larves pénètreront dans les bourgeons. Les dégâts ne seront visibles qu'au débourrement (dessèchement des boutons). Dans les vergers où la présence de ce ravageur est constatée effectuer un traitement vers le 15 Septembre à l'aide d'un produit à base d'H.C.H. ou de Lindane, après la récolte.

uzère du poirier et du pommier

La zeuzère fait preuve d'activité. Il est nécessaire de poursuivre la protection contre cet insecte notamment dans les vergers où des attaques ont déjà été observées.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux - P. BERVILLE

Le Contrôleur de la Protection des Végétaux,

M. BEZUT

